

Vacunas para bebés

Una guía para los padres
¡Estas son las vacunas que necesita su bebé!

Al nacer	**HepB**
A los 2 meses	**HepB** + **DTaP** + **PCV** + **Hib** + **Polio** + **RV** 1 a 2 meses[1]
A los 4 meses	**HepB**[2] + **DTaP** + **PCV** + **Hib** + **Polio** + **RV**
A los 6 meses	**HepB** + **DTaP** + **PCV** + **Hib**[3] + **Polio** + **RV**[4] + **Influenza**[5] 6 a 18 meses[1] 6 a 18 meses[1]
12 meses o más	**MMR** + **DTaP** + **PCV** + **Hib** + **Varicela** + **HepA**[6] + **Influenza**[5] 12 a 15 meses[1] 15 a 18 meses[1] 12 a 15 meses[1] 12 a 15 meses[1] 12 a 15 meses[1] 12 a 23 meses[1]

Consulte a su médico o enfermera para estar seguro de que su bebé esté recibiendo todas las vacunas a tiempo. Muchas veces las vacunas se combinan para no tener que poner tantas inyecciones. Asegúrese de pedir su comprobante de vacunación con las fechas de las vacunas de su bebé; llévela todas las veces que vaya al médico.

La siguiente es una lista de las enfermedades contra las que estará protegido su bebé:

HepB: hepatitis B, una enfermedad seria del hígado

DTaP: difteria, tétanos y tos ferina

PCV: la vacuna neumocócica conjugada protege contra una infección seria de la sangre, los pulmones y el cerebro

Hib: *Haemophilus influenzae* tipo b, una infección seria del cerebro, la garganta y la sangre

Polio: polio, una enfermedad seria que causa parálisis

RV: infección por rotavirus, una enfermedad diarreica seria

Influenza (gripe): una infección seria de los pulmones

MMR: sarampión, paperas y rubéola

HepA: hepatitis A, una enfermedad seria del hígado

Varicela

Notas aclaratorias de la tabla de arriba:

1. Esta es la gama de edad en que se debe dar la vacuna.
2. Es posible que su bebé no necesite una dosis de la vacuna Hep B a los 4 meses de edad, dependiendo de la vacuna que se use. Consulte a su médico o enfermera.
3. Es posible que su bebé no necesite una dosis de la vacuna Hib a los 6 meses de edad, dependiendo de la vacuna que se use. Consulte a su médico o enfermera.
4. Es posible que su bebé no necesite una dosis de la vacuna RV a los 6 meses de edad, dependiendo de la vacuna que se use. Consulte a su médico o enfermera.
5. Los niños de 6 meses de edad o mayores deben ser vacunados contra la influenza todos los años en el otoño o en el invierno.
6. Su hijo necesitará 2 dosis de la vacuna HepA, la segunda dosis al menos 6 meses después de la primera.

Translation by Transcend, Davis, CA

www.immunize.org/catg.d/p4010-01.pdf • Item #P4010-01 Spanish (2/13)